

da manhã até ás quatro da tarde. Este segundo paroxismo algumas vezes annunciava-se com huma certa sensação de frio, e com maior ou menor abatimento. Depois o pulso ou se tornava mais forte e cheio do que o natural, (Art. 2.º, Secção II.) augmentando-se para logo o calor do corpo consideravelmente; mostrando a pelle huma côr avermelhada, e hum tanto escura; queixando-se os doentes mais ou menos de seccuras, e de sede; apparecendo huma reagem esbranquiçada, outras vezes amarellada, na lingua; faltando o appetite; crescendo a dor de cabeça; e as dores, e moimento nas extremidades, e tronco; tornando-se os olhos como incendia-

tinuas regulares as suas exacerbações apparecem constantemente das cinco para as seis horas da tarde, ou hum pouco mais tarde; em quanto as exacerbações das febres intermittentes e remittentes, e continuas irregulares se observão em qualquer outro tempo das vinte e quatro horas, particularmente des das oito da manhã até ás oito da noite; em cujo periodo os ataques das febres, de qualquer natureza que sejam, estão para aquelles que acontecem des das oito horas da noite até ás sete ou oito da manhã, como dez para hum.

Sendo pois as exacerbações das febres continuas regulares das cinco para as seis horas da tarde, deve entender-se que o primeiro paroxismo da febre (ainda que esta renha apparecido a qualquer outra hora des das seis da manhã de qualquer dia, até á mesma hora do dia subsequente) principiou ou teve lugar das cinco para as seis horas da tarde do primeiro dia; por exemplo, atacando a febre a qualquer hora, entre as seis da manhã do Domingo, e as seis da manhã da segunda feira, o segundo paroxismo apparece das cinco para as seis da tarde da segunda feira, e o primeiro paroxismo entende-se haver começado das cinco para as seis da tarde do Domingo, embora a febre haja atacado a qualquer hora antes ou depois.

Deste modo determina-se facilmente o principio da febre, e marca-se com certeza a sua marcha; e por isso podem designar-se com exactidão os dias, em que a mesma febre costuma fazer crise.

dos; e sobrevindo logo hum principio de delirio: ou sentia com o vigor, e plenitude do estado natural; mas dando a conhecer huma certa molleza; (Art. 2.º, Secção II.) e então o calor do corpo não era tão grande; a pelle mostrava huma côr avermelhada mais escura; as seccuras; e a sede não erão constantemente tão fortes; todavia a lingua mostrava huma teagem mais espessa, e de huma côr, que atirava para hum amarello escuro; a dor de cabeça, e as dores pelo tronco, e extremidades tornavão-se muito incommodas; os olhos mostravão-se languidos, e como inertes, não podendo os doentes fixa-los em qualquer objecto; ainda mesmo por pouco tempo; e, ou logo, ou no progresso desta exacerbação se notava algum delirio, e, sobre tudo, huma grande depressão de forças. Outras vezes sem preceder sensação alguma de frio, e notando-se apenas mais algum quebrantamento do corpo, se desenvolvia o calor no segundo paroxismo, apparecendo mais ou menos dos symptomas já referidos, e em diferentes grãos de intensidade, Em geral, naquelles casos, em que a febre atacava sem calefrios decididos, sem maiores ou menores horripilações, etc., (Artigos 1.º e 3.º, Secção II.) o segundo paroxismo não era tão regular.

ART. V. No terceiro paroxismo naquelles casos, em que a febre se manifestava por calefrios decididos, etc., (Art. 2.º, Secção II.) quando o pulso batia mais forte, e cheio do que o natural, de ordinario, augmentavão-se consideravelmente o calor, e a seccura da pelle; a lingua tornava-se cada vez mais secca, e saburrosa,

mas a saburra não era muito viscosa; crescião a sede, e o tédio ao alimento; a urina vinha em pequena quantidade, e córada; as evacuações alvinas erão parcas, e a materia destas parecia como resequida; os olhos tornavão-se mais incendiados; e augmentavão-se o delirio, e a dor de cabeça. Mas quando o pulso mostrava a plenitude, e vigor natural, e, ao mesmo tempo, dava a conhecer certa molleza, (Art. 2.º, Secção II.) então a pelle, bem que secca e aspera, não era tão quente; a lingua via-se mui saburrosa, e a saburra era muito viscosa, e, mais ou menos secca, e escura; a sede, e o fastio crescião; a urina vinha em pequena quantidade, e quasi da côr natural; as evacuações alvinas afastavão-se da ordem natural, e a materia dellas accusava grande degeneração; o delirio, se já tinha apparecido no decurso do segundo paroxismo, augmentava-se neste muito mais, e se ainda não se havia dado a conhecer, não deixava de se manifestar no progresso desta exacerbação, até ás duas, ou tres horas da noite, quando diminuia sensivelmente; queixavão-se os doentes de maior ou menor oppressão no estomago, e no peito; e de ordinario accusavão hum certo estado dorido do corpo, que os obrigaria a mudarem de posição a cada momento se os não tolhesse a grande depressão de forças.

ART. VI. Quando a febre atacava na fórmula referida nos Artigos 1.º e 3.º desta Secção, em geral, durante o terceiro paroxismo, o calor, e a secura da pelle não erão tão notaveis como em qualquer dos casos referidos no Artigo antecedente; a lingua não era tão sa-

burrosa, porém mostrava mais ou menos secura; havia mais esquecimento do que aversão ao alimento; o ventre estava remisso; apparecia a urina em pequena quantidade, e quasi da côr natural, as faculdades intellectuaes mostravão mais inacção do que confusão, e esse estado de inacção diminuia mais ou menos nas declinações dos paroxismos, porém augmentava de exacerbação em exacerbação, até se converter em delirio (1); sentião os doentes hum certo pezo, e afflicção no peito, que os obrigava a suspirar de quando em quando, e de que ás vezes se allivjavão hum pouco, se por ventura choravão;

(1) O delirio, que se observava nestes casos assim pela maneira lenta, porque elle se desenvolvia, como pela falta de symptomas de turgencia, e inflammação de cerebro em semelhantes circumstancias, nascia, a meu ver, dos movimentos desordenados do mesmo cerebro, em consequencia da maior ou menor falta de acção, ou estado torpido dessa viscera. O delirio que se observava naquelles casos, em que a febre se dava a conhecer por calefrios decididos, etc., e em que o pulso, no periodo do calor do primeiro paroxismo, se mostrava mais forte, e cheio do que o natural (Art. 2.º Secção II.) assim pela rapidez, com que elle se formava, e pela violencia que elle mostrava, como pelo estado de repleção, que apresentavão os vasos sanguineos dos olhos (Artigos 4.º e 5.º, Secção II.) e da cabeça, estribava-se, a meu entender, nos movimentos desordenados do cerebro, mas nascendo estes de maior ou menor turgencia, ou congestão desta viscera; e mesmo de hum certo estado de inflammação, em que ás vezes parecia cahir em taes circumstancias. Finalmente o delirio, que se observava naquelles casos, em que a febre atacava com calefrios evidentes, etc., e em que o pulso, conservando quasi a plenitude, e vigor natural, mostrava huma certa molleza, (Art. 2.º, Secção II.) parecia participar da natureza de ambas as especies mencionadas, apresentando humas vezes mais o aspecto da primeira, outras vezes mais o aspecto da segunda, á medida que prevalecia mais ou menos, ora a causa de huma, ora a causa da outra.

a dôr de cabeça era acompanhada de maior ou menor esvaimento desta; e o pulso cada vez se tornava mais frequente, e pequeno.

ART. VII. Do terceiro paroxismo por diante crescia a febre de exacerbação em axacerbação até chegar ao seu auge, augmentando-se os symptomas que já se apontá-rão, e apparecendo outros, taes como hemorrhagias de nariz; inchação de ventre; maior ou menor inflammação, pela maior parte no ventre, algumas vezes no peito, e rarissimas vezes no cerebro; contracções espasmódicas nas extremidades, etc. Quando a febre atacava para logo com calefrios manifestos, etc., se o pulso no periodo do calor do primeiro paroxismo se mostrava mais cheio, e forte do que o natural, (Artigos 2.º, 4.º e 5.º, Secção II.) de ordinario antes do quinto dia observavão-se hemorrhagias de nariz, e mais ou menos inflammação do figado, do peritoneo, e huma ou outra vez do cerebro: mas se o pulso no periodo do calor do primeiro paroxismo batia quasi com o vigor, e plenitude do estado natural, e mostrava, ao mesmo tempo, huma certa molleza, (Artigos 2.º, 4.º, 5.º, Secção II.) então, pela maior parte, só depois do setimo dia se dá-vão a conhecer hum certo estado de congestão, e inflammação no ventre, com inchação, e sensibilidade deste, e hum certo estado de inflammação, oppressão, e sensibilidade no peito. As hemorrhagias, nestes casos, geralmente se observavão depois do decimoquarto dia; e erão quasi sempre hum symptoma pouco favoravel. E quando a febre atacava do modo, que se descreveo nos Ar-

tigos 1.º e 3.º desta Secção, as hemorragias não se observavão senão depois do decimoquarto dia, e erão menos frequentes, e também menos fataes. Nestes casos raras vezes apparecia inflammação alguma, e se acaso se notava, era no ventre, o qual então accusava mais ou menos sensibilidade. Pelo contrario a tympanitis, e as contracções espasmodicas das extremidades erão mui frequentes.

ART. VIII. Da declinação natural da febre, isto he, da diminuição da intensidade dos seus symptomas, e do progresso natural da mesma, isto he, do augmento da intensidade dos seus symptomas, não posso offerecer aquil hum juizo exacto; por quanto nunca observei o seu ataque, progresso, e terminação favoravel ou fatal, sem que os doentes mais cedo ou mais tarde fizessem uso de remedios, que atalhavão ou favorecião a sua marcha natural. Todavia eu vou expor, conforme a minha observação, as diversas circumstancias, que de ordinario precedião, e acompanhavão ora a sua declinação, e terminação favoravel, ora o seu progresso, e terminação fatal, segundo as varias fórmas, porque ella atacava, (Artigos 1.º, 2.º e 3.º, Secção II.) e porque se desenvolvia. (Artigos 4.º, 5.º, 6.º e 7.º, Secção II.)

ART. IX. Em primeiro lugar naquelles casos, em que a febre atacava com calefrios manifestos, quando o pulso no periodo do calor do primeiro paroxismo se mostrava mais forte, e cheio do que o natural (Artigo 2.º, Secção II.) se os doentes erão tratados a tempo, e competentemente, de ordinario terminava a febre favoravel.

mente desde do setimo dia até ao decimo quarto. A sua declinação annunciava-se deste modo: -- o ventre tornava-se molle, baixo, e sem sensibilidade alguma; havia em cada vinte e quatro horas tres, quatro, e mais dejecções biliosas; o pulso perdia a sua plenitude, e vigor excessivo, e mostrava-se menos frequente; diminuia o calor da pelle, e tomava esta huma côr mais natural; depois apparecia huma branda transpiração; a lingua tornava-se humida, e começava a cahir a sua crusta saburrosa; os olhos já não estavam incendiados; os vasos sanguineos da cabeça não mostravão repleção alguma; o delirio diminuia; e ou se dissipava, se a terminação da molestia era mais cedo, ou se convertia em somnolencia, e alguma surdez, se a doença terminava mais tarde; a urina depunha algum sedimento; e os doentes se sentião como reanimados. Pelo contrario, quando os doentes não tinhão sido tratados a tempo, e competentemente, então a molestia marchava para a sua terminação fatal; e nestas circumstancias o ventre prendia-se, e inchava cada vez mais, tornando-se mais ou menos sensivel, o delirio era mui violento, particularmente se no cerebro havia d'antes existido congestão, ou inflammação por pequenas que fossem; o pulso mostrava-se desordenado, ora intercadente, ora mui frequente, e de vigor natural, ora frequentissimo, e contrahido; sobrevinha depois huma respiração afanosa, que augmentava cada vez mais; e então os doentes tornavão-se insensiveis até ao momento fatal, que algumas vezes era precedido por huma convulsão mais ou menos notavel.

ART. X. Em segundo lugar naquelles casos, em que a febre atacava com calefrios manifestos, etc., quando o pulso no periodo do calor do primeiro paroxismo conservava a sua plenitude, e vigor natural, mostrando ao mesmo tempo certa molleza (Art. 2.º, Secção II.) se os doentes erão tratados a tempo, e com remedios adequados á indole da molestia, e se as suas constituições fysicas não estavam enfraquecidas, e arruinadas, então a febre terminava favoravelmente des do setimo dia até ao vigesimo primeiro, ora mais cedo, ora mais tarde. A sua declinação dava-se a conhecer deste modo: -- o ventre mostrava-se molle, baixo, e sem sensibilidade alguma; soltava-se este nas vinte e quatro horas tres, quatro, e mais vezes, sendo as camaras viscosas, e biliosas; o pulso batia com menos frequencia, e perdia a molleza, que lhe era particular; a tosse, se por ventura a havia, e a oppressão do peito, desvanecião-se; apparecia huma branda transpiração na pelle, e logo a cõr vermelha escura desta; o estado dorido do corpo, e a depressão de forças começavão a dissipar-se; despegava-se a crusta saburrosa da lingua, deixando esta como escoriada, quando humida, e liza como vidro, quando secca, cujas apparencias pouco a pouco se convertião no estado ou aspecto natural da mesma lingua; a urina depunha algum sedimento; o delirio diminuia nas exacerbações, e convertia-se em huma lethargia mais ou menos intensa, e em surdez; e depois sobrevinha hum somno mais ou menos descansado, que reanimava os enfermos. Pelo contrario, quando os doentes não erão trata-

dos a tempo, ou quando erão tratados com remédios contrarios á indole da molestia, ou quando tinhão huma constituição fysica morbosa, então a febre marchava para a sua terminação fatal; e nestas circumstancias a oppressão do peito tornava-se espantosa, quando o pulmão estava atacado de maior ou menor inflammação, e logo a tosse augmentava-se cada vez mais; e a expectoração tornava-se escassa, e difficultosa. Estes symptomas porém não erão tão notaveis, e mesmo não se deixavão observar, quando a inflammação parecia ter atacado o baixo ventre, em cujo caso a tympanitis crescia muito, notava-se sensibilidade no ventre, e apenas se observava maior ou menor oppressão no peito. Em qualquer desses casos a lingua via-se cada vez mais secca, e escura no meio; os dentes cobrião-se de huma materia viscosa, que seccava, e se fazia escura; o halito era mui fetido; o pulso accelerava-se de modo que não se podião contar as pulsações; o delirio tornava-se mais, e mais violento até se converter em perfeita apathia; então os olhos conservavão-se entre abertos, mostrando a apparencia de vidro empannado; as extremidades arrefecião; apparecia hum suor frio na testa, e peito, e depois a morte, que geralmente acontecia do setimo até ao decimo quarto dia; porém algumas vezes mais tarde, particularmente se havia certa irregularidade de symptomas, assim pelo que respeitava á existencia destes, como pelo que pertencia á sua intensidade, etc. (Artigos 11.º e 12.º, Secção II.)

ART. XI. Em terceiro lugar naquelles casos, em que

a febre atacava com pequenos arrepiamentos de frio, pequenas dores de cabeça, etc., e em que os doentes passavam pouco incommodados hum, dous, e mais dias, até se formar mais ou menos claramente o primeiro paroxismo: (Art. 1.º, Secção II.) se os doentes erão tratados a tempo, e com remedios adequados ao genio da molestia, e se as suas constituições fysicas não estavam arruinadas, então a febre terminava favoravelmente, de ordinario, depois do decimo quarto dia. A sua declinação dava-se a conhecer deste modo: -- o ventre tornava-se molle, baixo, e sem sensibilidade alguma; as dejecções appareião muito a miudo, e erão biliosas; a urina vinha mais corada; a lingua mostrava-se humida, e a sua crusta saburrosa despegava-se pouco a pouco; a pelle perdia a côr de rosa escura, e aspereza com que estava; e logo o pulso diminuia em frequencia, e se sentia mais vigoroso; depois via-se huma branda transpiração na mesma pelle; e então o pulso quasi se reduzia ao estado natural; a dor de cabeça, as dores, e moimento pelo corpo, a oppressão do peito, e o delirio diminuião gradualmente, e por fim se dissipavão assim que a transpiração se deixava ver: nestas circumstancias voltava o somno mais ou menos extenso, e consolador, e com elle a convalescença. Pelo contrario quando os doentes não erão tratados a tempo, ou erão tratados com remedios contrarios á natureza da doença, ou tinham hum constituição fysica arruinada, e morbosa, então a febre encaminhava-se para a sua terminação fatal, dando-se esta a conhecer, ora por hum augmento regular, e progressivo.

sivo dos symptomas, ora por hum estado mais ou menos irregular dos mesmos. Assim no primeiro caso appareção o ventre cada vez mais tumido, e sensivel; as dejecções aquosas, fetidas, e involuntarias; a urina em maior ou menor quantidade, clara como agua, e soltando-se ás vezes involuntariamente; a pelle mais secca e aspera; a lingua secca, e aspera se ainda conservava a crusta saburrosa, e secca, e liza como vidro se esta já tinha cahido; o pulso cada vez mais pequeno, frequente, e contrahido; maior oppressão no peito acompanhada de anhelito; delirio cada vez mais intenso até se converter n' huma total inacção das faculdades intellectuaes; vomitos; difficuldade de engolir; estado desfigurado das feições do rosto; suóres frios parciaes; e por fim a morte, que, de ordinario, acontecia depois do decimo quarto dia por diante, mais cedo, ou mais tarde. No segundo caso humas vezes não se apresentavão os symptomas com huma igual intensidade em todas as partes do corpo, durante o progresso da febre; por exemplo o delirio, e a dor de cabeça erão muito maiores, ou em maior grão proporcionalmente ao estado do pulso, e da lingua; e *vice versa*, etc. Outras vezes mesmo não existião alguns dos symptomas; por exemplo a dor de cabeça, o calor da pelle, e a frequencia do pulso, etc. Outras vezes appareção alguns sinaes criticos em algumas partes; e, todavia, em outras augmentavão-se os symptomas; por exemplo, ou apparecia huma transpiração mais ou menos geral, e com tudo o pulso não se emendava nada; a oppressão do peito, o estado tympanitico do ven-

tre, e o delírio, etc., crescião: ou observava-se o pulso menos frequente, e mais vigoroso, e com tudo a pelle continuava cada vez mais secca e aspera: ou notava-se que a lingua se tornava humida, e que a urina depunha algum sedimento, e todavia o pulso aligeirava-se mais, a dor de cabeça, e o delírio augmentavão-se: ou crescião todos os symptomas, e com tudo o delírio diminua, e até cessava de todo; e depois que os doentes tinham recobrado o uso das suas faculdades intellectuales por vinte e quatro horas, mais ou menos, falecião. Outras vezes, finalmente, observava-se huma diminuição de todos os symptomas por hum ou dous dias, e depois sem huma causa conhecida tornavão elles a augmentar; e estas, para assim dizer, oscillações da febre, apparecião mais ou menos vezes; e, pela maior parte, tanto esta como as outras irregularidades mencionadas, davão annuncio de hum exito funesto.

ART. XII. Em quarto lugar naquellès casos, em que a febre atacava com insignificantes arrepiamentos de frio, etc., e em que, sem se observar mais ou menos claramente o primeiro paroxismo, se vião desenvolver, e augmentar imperceptivelmente os seus symptomas: se os doentes erão tratados a tempo, e competentemente, e se as suas constituições fysicas não estavão muito arruinadas, então a febre terminava algumas vezes favoravelmente; porém a sua terminação era mui tarda, vindo a ter lugar depois do vigesimo primeiro dia. A sua declinação annunciava-se primeiramente pelo aspecto regular, que hião tomando todos os symptomas; e depois pela di-

minuição destes gradual, e quasi imperceptivel. Pelo contrario, se os doentes não são tratados a tempo, e competentemente, ou se têm huma constituição fysica arruinada, então a febre caminhava para a sua terminação fatal, que era igualmente tarda; e nestas circumstancias observava-se quasi constantemente hum estado muito irregular dos symptomas da febre, (Art. 11.º, Secção II.) e depois o augmento excessivo de alguns delles, após do que sobrevinha a morte.

ART. XIII. Em qualquer destes casos, (Artigos 9.º, 10.º, 11.º e 12.º, Secção II.) particularmente naquelles a que diz respeito o Art. 10.º, quando a febre era violenta, algumas vezes apparecia maior ou menor inflammation das parotidas, depois da declinação da febre, e mesmo quando esta já havia terminado, e os doentes estavam convalescendo. Igualmente nas mesmas circumstancias appareção vomitos de bilis-verdoenga, quasi sempre que os doentes bebião algum caldo, ou outro liquido; e estes vomitos se observavão ainda quando os doentes, no decurso da molestia, havião sido competentemente evacuados.

ART. XIV. Em qualquer destes casos, (Artigos 9.º, 10.º, 11.º e 12.º, Secção II.) quando a febre não terminava favoravel ou fatalmente, conforme se expoz nesses Artigos, e quando os doentes não tinham sido evacuados competentemente, algumas vezes, na declinação da febre, apparecia huma diarrhea mais ou menos biliosa; a qual, não sendo tratada com remedios purgativos, vinha, de ordinario, a converter-se em huma dysenteria mais ou menos fatal.