
SECÇÃO IV.

Do tratamento Medico da Febre Epidemica Contagiosa.

I expect fevers may be sometime so well understood, as to be certainly curable; depending upon our future knowlege of the associations of the various parts of the system!

Darwin.

ART. I. **E**U passo a considerar o curativo da Febre Epidemica Contagiosa dividido em duas partes. Na primeira apontarei os remedios de que fiz uso no principio da Epidemia, tempo em que eu não tinha formado ainda hum juizo exacto da sua natureza, e character. Na segunda exporei os differentes methodos curativos de que me servi no ultimo periodo da mesma Epidemia, de cuja propriedade me havião capacitado as observações, que até então acabava de fazer; e de cuja utilidade me convenceo depois a minha ulterior experiencia.

ART. II. A principio a idéa, que eu fazia da febre, era que esta sendo produzida por mais ou menos causas excitantes (Secção I.), consistia n' hum torpor das funções do estomago já directo, já indirecto, o qual desar-

ranjava proporcionalmente o resto das funções da vida organica, e bem assim as da vida animal. E como eu imaginava que em taes circumstancias o succo gastrico não podia ser segregado nem na quantidade, nem com a qualidade do estado da saude; e além disto que as funções do figado devião particularmente soffrer, attenta a dependencia, que ha entre este orgão, e o estomago; por isso começava sempre o meu curativo, huma vez que eu visse o doente antes do quinto dia da molestia, por hum emetico, como o seguinte:

N.º I.º R.º Antimonio tartarizado - grãos tres
Ipecacuanha em pó - grãos quinze

Dissolva em

Agua - - - - - meia libra.

Do qual ordenava huma onça de oito a oito minutos, até excitar vomitos. Depois, attendendo ainda ao estado das funções do estomago, e do figado por huma parte, e pela outra tendo em consideração não só a utilidade, que o Doutor Fordyce tirára em todas as febres (vêde as suas Dissertações) das preparações antimonias em doses pequenas, que elle tanto recommenda, como hum dos meios mais capazes de facilitar a crise, promovendo o suor; mas tambem os bons effeitos, que o Doutor Hamilton observára do uso dos purgativos nas mesmas doenças, como nos consta do seu excellent Tratado, eu empregava debaixo destes principios, com maiores ou menores intervallos, segundo as circumstancias, huma dose do

N.º 2.º R » Pós antimoniaes } aã grãos doze
 Calomelanos }
 m.º e divida em seis doses.

E além disto recommendava logo depois de cada dose deste remedio duas ou tres onças do seguinte:

N.º 3.º R » Cosimento de raiz de chi-
 córea - - - - - libra e meia
 Espirito de Mindereri - seis oitavas
 m.º

Outras vezes, depois do emetico, em lugar dos remedios N.º 2.º e 3.º, ordenava, debaixo das mesmas vistas, com intervallos de quatro horas mais ou menos, duas onças do seguinte:

N.º 4.º R » Antimonio tartarizado - grãos dous
 Dissolva em
 Agua - - - - - onças quinze.

E todos os dias de manhã, e tambem á noite se necessario era, huma dose do seguinte purgativo:

N.º 5.º R » Ruibarbo em pó - - - grãos cinco
 Calomelanos - - - - - grãos dous
 Alkali vegetal vitriolado - grãos dez
 m.º e triture bem para huma dose.
 Prepare tres doses destas.

Com estes meios, apenas, e huma dieta competente, (Secção IV., Art. 10.º) regulando o temperamento dos enfermos, conforme as suas sensações, eu observava a marcha da molestia.

ART. III. Durante o uso dos medicamentos referidos os doentes, de ordinario, soltavão-se de ventre tres ou quatro vezes por dia; as camaras erão biliosas; a pelle amaciava-se, e apparecia ás vezes com mais ou menos suor, em cujo caso a lingua tornava-se humida, etc.: e então ou a febre dava indicios de terminar des do setimo até ao decimoquarto dia, ou aliás os symptomas se augmentavão, mostrando a sua violencia. No primeiro caso pouco restava que fazer; no segundo receoso eu ainda de que a debilidadade viesse, a final, a ser nociva aos enfermos, ordenava de quatro a quatro horas, com maiores ou menores intervallos, duas onças mais ou menos do seguinte:

N.º 6.º R „ Cosimento de quina - - dez onças
 Tintura de quina - - - huma onça
 Laudano liquido de Sydenh. trinta gottas
 Xar. de casca de laranja - huma onça
 m.º

Ou duas onças do seguinte:

N.º 7.º R „ Angustura - - - - duas oitavas
 Quina - - - - tres oitavas
 Faça cosimento para onças treze.

A' coadura ajunte

Ether sulfurico - - - - - huma oitava

Laudano liquido de Syd. - 36 gotas
m.^e

E que bebessem os enfermos, meia hora depois de
qualquer destes remedios, onça e meia, ou huma onça
da limonada seguinte :

N.º 8.º R » Agua - - - - - libras duas

Acidule levemente com

Acido vitriolico aromatico q. b.

E attendendo á inchação de ventre, determinava ou
o cristel

N.º 9.º R » Cosimento de flores de macella - meia libra

Mistura canforada

Mistura de almiscar } aã onça e meia

Mucil. de gom. arab. - - - duas onças
m.^e

Ou o cristel

N.º 10.º R » Cosimento de quina - onças cinco

Assa-fetida desfeita em

gema d'ovo - - - huma oitava

Mistura canforada - - - duas onças

Mucil. de amido - - - duas onças

m.^e

Porém devo confessar que nunca jámais observei allivio manifesto durante o uso destes ultimos remedios N.ºs 6.º, 7.º, 9.º e 10.º; e que, pelo contrario, não poucas vezes, notei exacerbarem-se mais ou menos, muitos ou quasi todos os symptomas, á medida que havia maior ou menor sensibilidade de ventre; embora em taes circumstancias sobresahissem as apparencias da maior debilidade! Esta observação pois, e huma importante reflexão, que o immortal Darwin faz na sua Zoonomia, Classe II., Ord. I., Gen. 3.º, Sp. 1., ácerca dos estímulos nas Febres, e que consiste em os regular sempre pelo estado do pulso durante o seu uso, não só me tornarão reservado em quanto á applicação de semelhantes remedios na Febre Epidemica Contagiosa; mas tambem me suscitárão a idéa de que nesta Epidemia reinava huma inflammção, ou estado análogo a esta, quasi sempre no baixo ventre; e que, por isso, os estímulos erão tão decididamente nocivos.

ART. IV. Não obstante isto, como a Febre procedia geralmente de contagio, e como o estado do pulso e a depressão de forças dos doentes inculcavão grande debilidade geral, eu não me animava ainda, guiado só pela opinião que havia formado já (Secção IV., Art. 3.º) a empregar os meios, que me parecião os mais acertados, quaes erão as evacuações sanguineas, tanto mais quanto estas erão olhadas por muitos Praticos modernos de bom nome, como alheias do verdadeiro tratamento de semelhantes molestias. Assim, tendo já empregado os remedios de N.º 1.º até 5.º inclusivè, vendo

que por meio delles a febre não terminava, e que os doentes mostravão grande abatimento, com inchação, e sensibilidade de ventre, e temendo já o uso dos remedios de N.º 6.º até 10.º inclusivè (Secção IV., Art. 3.º) por huma parte, e pela outra receando ainda recorrer á applicação das evacuações sangüineas (1), eu principiei a récommendar, de quatro a quatro horas, duas ou tres onças do seguinte:

N. 11.º R „ Cosimento de raiz de chicorea libr. e meia
Infunda nas ultimas fervuras

Musgo islandico - - - duas oitavas

Raiz de polygala seneka - huma oitava

A' coadura ajunte

Vinho de antimonio - - huma oitava

Laudano liquido de sydenh. meia oitava

m.º

E que bebessem os enfermos, meia hora depois deste remedio, onça e meia da seguinte limonada:

N.º 12.º R „ Agua - - - - - libras duas

Acido nitrico - - - huma oitava

m.º

(1) Neste tempo ainda eu não tinha lido o Tratado da Febre escripto, e publicado pelo Doutor Beddoes em 1808, aliás as luzes, que nelle se contém, me terião illustrado a ponto de fazer, logo no principio da Epidemia, o juizo, que não pude formar senão passados alguns mezes.

E além disto que usassem todos os dias pela manhã, e até á noite se fosse necessario, de huma dose do remedio N.º 5.º; e, duas vezes no dia, do seguinte cristel:

N.º 13.º R „ Terebinthina - - - duas oitavas
 Desfaça em gem' d'ovo, e ajunte
 Cosimento de raiz de almei-
 rão - - - - - meia libra
 Mistura de almiscar }
 Mistura de canfora } aã huma onça
 m.º

Com a applicação de vesicatorios, e fomentações no ventre, segundo as circumstancias. Por este modo eu vi, em alguns casos da Febre Epidemica Contagiosa, emendarem-se pouco a pouco os symptomas, até que os doentes convalecião. Todavia a melhora nem sempre se obtinha, nem tão pouco, quando se conseguia, se manifestava ella de modo que dêsse a entender que a causa da doença havia sido cortada pela raiz. Eis o methodo curativo, que empreguei no primeiro periodo da dita Febre, o qual se póde olhar como a primeira das duas partes, em que tenho dividido o seu tratamento.

ART. V. Nos principios de Março de 1811, visitando eu, pela primeira vez, hum doente, que se achava no quinto dia da Febre, e que já tinha sido, dous dias antes, vomitado, achei, além dos symptomas geraes de quasi todas as febres, huma notavel sensibilidade sobre o hypochondrio direito, grande inchação de

ventre, alguma tosse, e dor no hombro direito, etc.: então ajuizei logo que neste caso havia complicação da Febre Epidemica Contagiosa com huma inflammação do figado, e talvez do peritonêo, e dos intestinos delgados (1), attenta a molleza particular do pulso, que se notava a par dos outros symptomas; e por isso projec-

(1) He da observação de muitos Escriptores Medicos, e, entre elles, com particularidade do Doutor Darwin, que nas inflammações do estomago, quasi sempre, e nas dos intestinos, algumas vezes, o pulso apparece molle, o que eu tenho verificado na minha pratica. Esta molleza do pulso tem muitas vezes, como Darwin observa, suspendido o uso, a tempo, da lanceta com grave prejuizo dos enfermos; e parece nascer da nausea ou enjojo, que tem lugar em semelhantes circumstancias. Nas inflammações da tunica peritonéa dos intestinos, com pulso duro e cheio, ha vomitos em vez de nausea, e ao mesmo tempo ha huma dor activa junto do embigo. Nestes casos a séde da inflammação deve ser diversa. Ora como todas as inflammações do estomago são acompanhadas de pulso molle, segue-se que nos casos da enteritis, em que o pulso he tambem molle, a séde inflammatoria deve ser proxima do estomago, isto he, nos intestinos delgados, e que pelo contrario na enteritis com pulso duro e cheio, ella deve ser afastada do estomago, isto he, abaixo da valvula do colon. (Vêde Zoonomia, Classe II., Ord. II., Gen. 2.º, Sp. 11.) A' vista disto não será por ventura justo suppôr que nos casos da segunda modificação ou variedade da Febre Epidemica Contagiosa, em que se notavão huma molleza particular do pulso, enjoos, e inchação, e sensibilidade de ventre, havia huma inflammação na tunica peritonéa dos intestinos delgados mais ou menos proxima do estomago? (Secção II., Art. 10.º, e Secção III., Art. 7.º) E que nos casos da primeira modificação, ou variedade da mesma Febre, em que se apresentava o pulso duro, cheio e forte, (Secção II., Art. 9.º, e Secção III., Art. 6.º) quando o ventre era a séde da inflammação (Secção IV., Art. 7.º) existia esta ou na tunica peritonéa dos intestinos grossos, ou simplesmente no peritonêo, que forra a cavidade do abdomen; e neste ultimo caso o progresso da molestia era menos rápido. Vêde

tando, para assim dizer, descomplicar a molestia, mandei logo applicar oito ou dez sanguesugas ao hypochondrio direito; e, assim que ellas cahirão, recommendei que puzessem sobre todo o ventre flannels, mettidas n' hum cosimento quente de alecrim e losna, e espremidas de modo, que ficassem apenas humidas, e de hum calór agradável; que repetissem esta applicação de cinco a cinco minutos até á quarta vez; e que, terminado este banho de vapor, houvessem de vedar o sangue. Ordenei mais que tomasse o doente, logo depois disto, o remedio seguinte:

N.º 14.º R. Calomelanos - grãos quatro
 Jalapa em pó - - grãos oito
 Tartaro solúvel - grãos doze
 m.º, e triture bem.

E que ficasse usando, de quatro a quatro horas, de duas onças da dissolução N.º 4.º, e dieta propria. (Secção IV., Art. 10.º) No dia seguinte observei hum allivio extraordinario, de tal sorte que não só a tosse, a dor do hombro, a inchação de ventre, e a grande sensibilidade sobre o figado, que denotavão a inflammação, se havião dissipado quasi de todo; mas tambem, ao mesmo tempo, os outros symptomas da Febre estavam muito moderados. E como o purgante N.º 14.º ti-

Tratado das doenças das visceras abdominaes de Pemberton, Cap. IX., e o Jornal Medico e Cirurgico de Edimburgo, vol. 7.º, p. 241 e 242.

inha produzido quatro, ou cinco camaras biliosas, a pelle se mostrava de huma côr mais natural e macia, e a lingua estava menos secca, etc., determinei que se continuasse no uso do remedio N.º 4.º, e da dieta (Secção IV., Art. 10.º). Isto bastou; por quanto no dia immediato, isto he, no setimo dia da febre, sobreveio hum suor copioso, que a fez terminar de todo.

ART. VI. O allivio prompto e manifesto, que a sangria local acabava de produzir neste caso, mostrou-me bem quanto era exacta a opinião, que me occorrêra ácerca do genio desta Epidemia; e as observações, que até esse tempo havia feito, me fornecêrão principios sufficientes não só para distinguir as differentes modificações, ou variedades da Febre Epidemica Contagiosa, já apontadas (Secção II., e Secção III.), mas tambem para formar diversas indicações, accommodadas a cada huma dellas. E desde então principiei eu a pôr em prática a segunda parte do tratamento da dita Febre, que passo a descrever.

ART. VII. Os casos, que constituíão a primeira modificação, ou variedade da Febre Epidemica Contagiosa, cuja historia se referio na segunda Secção, e cuja natureza se mostrou na Secção terceira forão mui raros, segundo a minha observação; por quanto apenas observei quatro; dous em que a inflammação existia no ventre, hum em que ella resedia no peito, e outro em que o cerebro, e suas membranas parecião soffrer. Em todos estes, que eu vi des dos primeiros dias, prestarão alguma cousa a principio os remedios N.ºs 1.º, 2.º e 3.º;

porém depois que a inflammação se deo bem a conli-
cer, a sangria geral (1) seguida da sangria topica, e
do purgativo N.º 14.º, ou cousa semelhante; e depois
que o pulso já tinha perdido o seu vigor excessivo, a
applicação de vesicatorios junto á séde da inflammação
produzirão maravilhosos effeitos, dissipando, para logo,
todos os symptomas inflammatorios, e deixando o sys-
tema em circumstancias de se libertar inteiramente da fe-
bre, dentro de poucos dias, pelo uso constante da dis-
solução N.º 4.º, e pela applicação occasional de hu-

(1) Nestes casos, ainda que o estado do pulso mostrava hum
incitamento excessivo no systema sanguineo, o que me fez asse-
melhar esta variedade da Febre Epidemica Contagiosa á febre sen-
sitiva irritativa de Darwin (Secção III., Art. 6.º), não falta-
vão todavia apparencias, que muitos Praticos olhão como sinais
do *Typho Grave*. De hum semelhante character foi a principio ava-
liada a febre amarella, que grassou nos Estados Unidos da Ame-
rica; e por isso o seu curativo nesse tempo, sendo bem alheio da
sua verdadeira indole, augmentou ainda mais a fatalidade da mes-
ma; até que hum dos principaes Medicos de Phyladelphia che-
gou a ver hum manuscripto, que o mero acaso havia posto nas
mãos do célebre Franklin; e nelle achou o verdadeiro remedio
dessa terrivel enfermidade: remedio, que em nada mais consistia
do que nas evacuações sanguineas; as quaes tinhão sido usadas
n'outros tempos, e, muitas vezes, com vantagem manifesta na
cura de muitas febres, e havião cahido em desprezo pela moda
dominante das Escolas Medicas modernas, onde se costumava en-
sinar que semelhantes doenças erão geralmente filhas da debili-
dade! Com quanta exactidão estas idéas vogão, facilmente se col-
ligirá da seguinte passagem, extrahida do 4.º Vol. dos Exames
Medicos do Doutor Rush, o qual, tratando da Febre amarella,
que reinou em Phyladelphia em 1797, diz: *Tenho curado mui-
tos doentes por meio de huma só sangria. A alguns foi preciso
perder mais de cem onças de sangue para se poderem curar.*

Multa renascentur, quæ jam cecidero: cadentque
Quæ nunc sunt in honore.

Horácio,

ma, ou mais doses do remedio N.º 5.º, ordenando, entretanto, a dieta appropriada (Secção IV. Art. 10.º).

ART. VIII. Os casos pertencentes á segunda modificação ou variedade, cuja historia já se descreveo (Secção II.), e cuja natureza já se discutio (Secção III.), forão os mais numerosos; de modo que os seus symptomas, considerados juntamente, formavão, para assim dizer, o caracter geral da Epidemia; em quanto que os symptomas dos poucos casos, assim da primeira como da terceira variedade, fazião olhar estas como anomalias. Nos casos pois desta modificação, ou variedade prestou muito o seguinte methodo curativo. Nos primeiros dias da febre erão sempre uteis o vomitorio N.º 1.º, e depois deste, ou huma dose do purgativo N.º 5.º, ou o purgante N.º 14.º, segundo as circumstancias. E logo que o ventre se havia movido tres ou quatro vezes, costumava eu empregar com vantagem os remedios N.ºs 2.º e 3.º; regulando o temperamento dos enfermos, segundo as suas sensações, e ordenando-lhes huma dieta propria (Secção IV., Art. 10.). Algumas vezes, por estes unicos meios, terminava a febre, sem se desenvolver o foco inflammatorio; outras porém vinha este a manifestar-se do quinto até ao nono dia, ora mais cedo, ora mais tarde. E nestes casos quer a séde da inflammação fosse no ventre, como geralmente acontecia, quer no peito, quer na cabeça, como huma ou outra vez succedia, eu mandava logo applicar mais ou menos sanguesugas (1) junto della; e depois que estas cahião, ou re-

(1) Eu já apontei as circumstancias, e razões, que me fi-