

commendava o uso do banho de vapor (Secção IV. ; Art. 5.º) se o ventre ou peito erão os lugares da inflammção, ou ordenava hum banho quente aos pés se esta atacava a cabeça. Terminado o banho, e vedado o sangue, determinava a applicação de hum ou mais vesicatorios, e a continuação do uso dos remedios N.ºs 2.º e 3.º Em o maior numero de casos estes meios forão mui proveitosos, e erão sufficientes para effectuar a cura. Em alguns porém não acontecia assim; por quanto ou tornavão a apparecer sinaes, que indicavão não se haver ainda dissipado inteiramente o foco inflammatorio; e então huma nova applicação de sanguesugas era necessaria, e aproveitava; ou, sem apparecerem esses sinaes, a febre continuava todavia; e nestas circumstancias fazião

zerão recorrer ao uso da primeira sangria local nesta Epidemia. (Secção IV. ; Artigos 3.º e 5.º). E tendo observado tanto nesta como em outras doencas, com apparencias de debilidade, optimos effectos das sangrias topicas por meio de sanguesugas, não posso deixar de repetir aqui que, não só nas febres com disposição inflammatoria, ou nas visceras abdominaes, ou em qualquer outro orgão do systema animal, se devem empregar semelhantes evacuações, como aconselha o Doutor Beddoes, *Obrá cit.* p. 185, mas também em toda a outra doença, na qual existe alguma irritação, ou disposição inflammatoria em huma ou outra parte do systema, quando o resto deste permanece effectivamente em grande torpor. Nestes termos hum semelhante remedio devia ser muito util em certos casos da Febre amarella, que grassou em Cadis, e povos adjacentes, descripta pelo Doutor Arejulla; nos quaes, como se vê da sua *Obrá: Breve Descripcion de la Fiebre Amarilla*, p. 172, apparecião estados contrarios de incitamento no systema animal; estando huma parte em vigor excessivo, e por isso com disposição inflammatoria, em quanto o resto se conservava em grande falta de energia; ainda que esse Author condemne tão afincadamente toda a qualidade de evacuações sanguineas nessa Epidemia. *Obrá cit.* p. 216.

diminuir a febre pouco a pouco os seguintes meios: primeiramente duas onças, de quatro a quatro horas, do seguinte remedio:

N.º 15.º R. Quina - - - - - duas oitavas
 Angustura - - - - - huma oitava
 Faça cozimento para libra e meia
 Ajunte nas ultimas fervuras
 Musgo islandico - - duas oitavas
 Raiz de polygala seneka meia oitava
 E á coadura mais
 Laudano liquido de Sy-
 denh. - - - dous escropulos
 Acido nitroso alcooliza-
 do - - - - - duas oitavas
 m.º

Em segundo lugar, duas onças da limonada N.º 12.º, huma hora depois deste remedio: em terceiro lugar a applicação de hum ou dous vesicatorios pequenos, de tres a tres dias: e finalmente o uso occasional de huma dose do purgativo N.º 5.º

ART. IX. Os casos, em fim, da terceira modificação, ou variedade, de cuja historia fallei na segunda Secção, e de cuja natureza tratei na Secção terceira, são tão raros, que formavão por isso huma das anomalias da Febre Epidemica Contagiosa (Secção IV. Art. 8.º). O seu methodo curativo mais appropriado era o seguinte: Principiava ordenando o vomitorio N.º 1.º, e de-

pois o uso dos pós N.º 2.º, e do cosimento N.º 3.º, nos primeiros cinco ou sete dias da molestia. Passado este tempo, recommendava o cosimento N.º 11.º, ou N.º 15.º, segundo as circumstancias; os cristeis da Receita N.º 13.º; os sinapismos nas plantas dos pés; os vesicatorios no ventre, ou a seguinte fomentação:

N.º 16.º R. Extracto thebaico - - duas oitavas
 Triture com q. b. de saliva
 para dissolver, e ajunte, triturando,
 huma gem' d'ovo
 Oleo canforado - - - huma onça.

O banho do vapor (Secção IV. Art. 5.º), e o uso occasional de huma dose do purgativo N.º 5.º, quando as circumstancias o pedião. E se por ventura appareça alguma irritação no ventre, mandava applicar duas sanguesugas, e depois que estas cahião, o banho de vapor.

ART. 10.º Tendo mostrado as duas partes do tratamento da Febre Epidemica Contagiosa, eu passo a dizer alguma cousa sobre a dieta, que eu geralmente recommendava em todos os casos das suas tres modificações ou variedades. Prohibia todo o alimento solido, ou animal ou vegetal, em quanto a febre estava no seu vigor; e humas vezes do alimento vegetal liquido, que constava, ou de caldos de farinha de sagú, e de trigo, fazendo coagular a mucilagem da materia farinhosa por meio da fervura, e depois dissolvendo-a em agua, e

ajuntando-lhe algum assucar , ou de caldos de pão torrado , fervendo este com agua , e ajuntando-lhe algum assucar , ou do cosimento de cevada , fazendo primeiramente coagular a mucilagem desta , fervendo-a em agua , e depois tornando-a a ferver em outra agua até que se dissolvesse , e ajuntando-lhe algum assucar , eu mandava dar porções , de quatro até seis onças , nos intervallos dos remedios. Outras vezes determinava iguaes ou menores porções , e do mesmo modo de alimento animal tambem liquido , que constava de caldos , preparados com as partes musculares de galinha ou vacca , os quaes , antes que se dessem aos doentes , se deixavão esfriar , para assim os despojar de toda a materia oleosa. Quando a febre hia já em declinação , ordenava algumas frutas cozidas ou assadas , e algum arroz solto nos caldos. E quando os doentes parecião entrar a convalescer , recomendava que passassem pouco a pouco ao uso de alimento vegetal solido , tal como pão , biscoitos , etc; e ao de alimento animal tambem solido , principiando por aquelle , que constava de carnes brancas.

ART. II.° Ultimamente na convalecencia de todos os casos das tres modificações , ou variedades da Febre Epidemica Contagiosa , quando já se não podia recear irritação alguma no ventre , nem tão pouco em qualquer outra parte do systema , eu applicava com muito proveito pequenas doses de quina em infusão ou em pó , seguidas de duas onças da limonada N. ° 12.° Nestas circunstancias o exercicio moderado de carruagem , com as cautelas precisas , concorria muito para o perfeito res-

tabelecimento dos enfermos, particularmente quando se proporcionava o alimento ás forças, então proprias do estomago.

ART. 12.º Do que venho de expôr nesta Secção podem tirar-se os seguintes Corollarios:

1.º Os remedios N.ºs 1.º, 2.º, 3.º e 4.º erão, em geral, adequados a todos os casos das tres variedades da Febre Epidemica Contagiosa, particularmente sendo empregados nos primeiros cinco dias da molestia (Artigos 2.º, 7.º, 8.º e 9.º).

2.º A sangria geral, seguida da sangria topica, era sómente adaptada aos casos da primeira variedade (Art. 5.º nota, e Art. 7.º).

3.º A sangria local por meio de sanguesugas, mais ou menos copiosa, e seguida do banho de vapor, era muito efficaz em dissipar o fôco inflammatorio, que se apresentava nos casos da segunda variedade, e todavia não augmentava a debilidade geral (Artigos 5.º e 8.º).

4.º A mesma sangria local feita por sanguesugas, em muy pequena quantidade, era appropriada para dissipar toda a irritação, que apparecia nos casos da terceira variedade (Art. 9.º).

5.º Os remedios N.ºs 5.º e 14.º erão mais ou menos uteis, em todo o decurso da doença, nos casos de qualquer das tres variedades, segundo o estado do ventre (Artigos 7.º, 8.º e 9.º).

6.º Os remedios N.ºs 6.º e 7.º, e os cristeis N.ºs 9.º e 10.º erão manifestamente prejudiciaes nos casos de todas as variedades, particularmente nos da primeira, e segunda (Art. 3.º).

7.º Os remedios Nos. 11.º, 12.º e 13.º, ou N.ºs 15.º, 12.º e 13.º, erão sempre proveitosos nos casos da primeira, e segunda variedade, se a inflammação estava dissipada, e nos casos da terceira modificação ou variedade, quando não havia irritação alguma (Artigos 7.º, 8.º e 9.º).

8.º Os vesicatorios, depois das evacuações sanguineas, produzião effectos maravilhosos nos casos da primeira, e segunda, e até nos da terceira variedade (Artigos 7.º, 8.º e 9.º).

9.º A dieta propria, nos casos de qualquer das tres variedades, era a que constava de substancias vegetaes, ou animaes em estado liquido (Art. 10.º).

10.º O uso da quina em pequenas doses, e da limonada N.º 12.º, o exercicio moderado de carruagem, e as precauções relativamente ao alimento, estado de animo, etc., adiantavão o restabelecimento dos doentes na convalecencia (Art. 11.º).

CONCLUSÃO GERAL.

AS paixões deprimentes, excitadas por motivo da Invasão Franceza; os frios, e humidade; a má qualidade de alimento, e a falta deste ao principio; e depois a materia do contagio, ou produzida por habitarem muitas pessoas em casas pequenas, immundas, e sem a ventilação precisa, ou gerada nos corpos dos febricitantes, forão as causas da Febre Epidemica Contagiosa (Secção I.).

A inchação, e sensibilidade de ventre, e depois os vomitos de bilis verdoenga constituíão o caracter proprio da dita Febre; e estes symptomas concorrendo ou com hum pulso cheio, e vigoroso, e com repleção dos vasos sanguineos da cabeça, ou com hum pulso notavelmente molle, e com huma grande depressão de forças, ou com hum pulso pequeno, pouco calor de pelle, e com huma manifesta irregularidade na marcha da molestia, constituíão os caracteres privativos das differentes modificações, ou variedades da mesma Febre (Secção II.).

A falta de energia das funções do estomago; os movimentos demasiadamente energicos de todos os outros orgãos da vida organica, e a perturbação das fun-

ções do cerebro, e de todos os mais órgãos da vida animal, formavão a essencia da primeira modificação, ou variedade da Febre Epidemica Contagiosa. A grande falta de energia das funções do estomago, o estado de movimentos contrarios do systema sanguineo, e por isso dos órgãos da vida organica, e a perturbação das funções do cerebro, e por isso de todos os outros órgãos da vida animal, constituão a essencia da segunda modificação ou variedade da dita Febre. A falta de energia das funções do estomago, do systema sanguineo, e do cerebro, ora separada, ora mais, ora menos conjunctamente; a falta de energia desigual, ou sem proporção, das diversas funções das duas vidas organica, e animal, e huma particular mobilidade dos intestinos, e peritoneo formavão a essencia da terceira modificação, ou variedade da mesma Febre (Secção III.).

Os emeticos, os purgativos brandos, os diaphoreticos, e a dieta parca formavão o curativo dos primeiros dias em todos os casos das tres modificações, ou variedades da Febre Epidemica Contagiosa. Além destes medicamentos pertencião com particularidade ao methodo curativo da primeira modificação, a sangria geral; a sangria topica depois, e successivamente os vesicatorios: ao da segunda, a sangria local, o banho de vapor, os pediluvios, os vesicatorios, e, depois de dissipado o foco inflammatorio, os sorbentes, combinados com os incitantes, em doses pequenas: ao da terceira, os sorbentes, e incitantes em doses moderadas, não havendo irritação no ventre, aliàs a applicação de duas sanguesu-

gas, seguida do banho de vapor antes do seu uso; os vesicatorios, as fomentações opiadas, e os cristéis de terebinthina com almiscar, e canfora (Secção IV.).

Rematarei esta Memoria sobre a Febre Epidemica Contagiosa, que grassou em Lisboa nos annos de 1810, e 1811, dirigindo aos Praticos, que no decurso dessa Epidemia se não puderão jámais determinar a fazer hum verdadeiro uso assim das evacuações sanguineas, como dos remedios purgativos, a seguinte importante sentença do Doutor Beddoes.

Honest Brunonians have of late minutely recorded cases, to them incomprehensible, where immense discharges have suddenly stoped a protracted fever, and left the patient improved in strength. Thus oppressive accumulations of blood are sometimes drained off.

Alguns Brownianos ingenuos tem ultimamente recordado com miudeza casos para elles incomprehen-
siveis, nos quaes excessivas evacuações tem suspendido de subito febres prolongadas, e deixado os doentes melho-
rados em forças. Assim accumulções de sangue oppres-
sivas são ás vezes removidas.

F I M.

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

...







